

Kedy pre vás kúpeľná liečba nie je vhodná

- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu (ak je niektoré ochorenie indikované na kúpeľnú starostlivosť združené s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárných skupín aktívnej tuberkulózy)
- všetky choroby v akútnom štádiu
- klinické známky obehového zlyhania
- stavy po hlbokkej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby
- labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus
- často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu
- kachexie každého druhu
- zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby
- epilepsia (okrem prípadov, pri ktorých sa v poslednom roku nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy). Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti
- aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
- závislosť na alkohole, závislosť na návykových látkach
- fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť; klient s takouto kontraindikáciou však môže prísť do kúpeľov ako samoplatca
- inkontinencia moču III. štádium a stolice, enuresis nocturna – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne
- demencia
- tehotenstvo
- nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu
- hypertenzia nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg)